

# 内視鏡的腸粘膜下層剥離術(大腸ESD)(4泊5日)を受けられるID: 様へ

パスコード:05007 世代:1

発行日:1900/01/00

経過	入院日	治療前	治療後	治療後1日目	治療後2日目	退院日
日付	/	/	/	/	/	/
達成目標	大腸ポリープの治療内容が理解できる 下剤の内服が確実にできる	検査に対する不安を表出できる 絶食を守ることができる	転倒しない 下血、腹痛がない	下血・腹痛がなく、食事が開始できる	下血・腹痛がない	退院後の注意点が理解できる
治療・処置 検査・薬剤	持参薬の確認をさせていただきます 22時に下剤(赤い錠剤3錠・水薬1本)を内服させていただきます 	朝6時よりモビプレップ(下剤)を内服していただきます 下剤を内服しながら病棟の中を歩いてください 腹痛、吐き気があれば申し出てください 排便がきれいになり、カメラ室の準備ができれば治療に行きます カメラ室で点滴をし、ポリープを切除します 水薬3セット内服しても排便が無い場合は内服を一旦中止し、看護師に知らせて下さい 朝の内服薬については看護師、薬剤師の指示通りに内服してください	 点滴は食事が始まるまで続けます 腹痛、吐き気があれば申し出てください	 朝の内服薬は特に指示がなければいつも通り内服してください 朝に採血をします 食事開始後問題なければ点滴は終了します 		
活動・安静度	とくに制限はありません	とくに制限はありません	治療後はお部屋まで車椅子で帰ります 特に制限はありませんが、その後できる限りお部屋で安静に過ごしてください 治療時、眠くなるお薬を使用しており、治療終了後足元がふらつく危険性がありますので注意してください ふらつきがある場合は歩く前に、看護師を呼んでください			
食事	注腸食 夜10時以降は絶食です (アメ・ガム・水は可)	朝から絶食です お水は飲んでもらってかまいません 	検査後より少量飲水可です 絶食です	夕方より5分粥食はじまります	5分粥食です	朝から全粥食です
清潔	制限ありません	入浴はできません	入浴はできません	清拭します	シャワー浴できます	
排泄		排便が5回目以降はトイレからナースコールを押してください。看護師が排便状況を確認します 病棟内のトイレを使用してください	ポリープを切除された場合は初めて排便があればトイレからナースコールを押して看護師に見せてください (便に血が混ざっていないかを確認します)			
患者様及びご家族への説明	入院期間(4泊5日分)の内服されている薬を持参してください (入院日の朝～退院日の朝の分まで) 主治医より入院・治療についての説明があります 名前確認のためにネームバンドをつけてさせていただきます レンタルパジャマの希望についておうかがいします 入院中や退院後の生活について、心配なことがあれば相談してください					<p>&lt;このような症状が出たら 受診してください&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下血:便に血が混じっているとき</li> <li>・腹痛・腹部膨満感</li> <li>・便・おならが数日でない</li> </ul> <p>&lt;日常生活について&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2週間程度は激しい運動やアルコールの摂取は控えましょう</li> <li>・食事は消化のよいものにしましょう</li> <li>・便通を整えましょう</li> <li>・退院後から入浴は可能です</li> </ul> 

注)この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。

大阪南医療センター クリニカルパス委員会 2019/3/29承認

主治医: