


周辺地域で麻疹感染事例の報告あり

<大阪府内における麻疹累積患者数(2020年~2026年)>



大阪府下麻疹患者増加中


麻疹ワクチン2回の接種歴を確認しましょう。

以外と2回目接種のない大人がいるんです

症状

発熱 咳嗽 鼻汁など

2-3日で解熱後、再度高熱と発疹が顔頸部を中心に出現する
口腔内に白いコプリック斑出現



麻疹症状の経過

国立感染症研究所資料一部改変

空気感染

ワクチン接種

微細なウイルスのため、マスク装着だけでは防ぎきれない。

特徴

感染力が非常に強い

妊婦や周辺の人には特に注意

抗体のない人は99%発症する

南海電鉄南海高野線やOsaka Metro御堂筋線(3/12-17)の利用者に患者発生

大阪府のホームページに情報があるので、各自ご確認ください

https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o100030/prs_51174.html

[麻疹（はしか）に関する注意情報（第2報：令和8年3月19日報道発表に係る追加及び訂正情報）](#) /大阪府（おおさかふ）ホームページ [Osaka Prefectural Government]

母子手帳のワクチン接種歴を確認しましょう

発症を疑う時は

かかりつけ医に電話で相談の上、受診方法を確認してください

接触の可能性を疑う時は

近隣の保健所へご相談ください

感染経路・予防

医療関係者の皆様

これからしばらくの間、疑いのある患者の来院が予想されます。職員のワクチン接種歴の確認。空気感染対策の準備。患者対応時のマニュアル確認。など推奨します

生年月日	麻疹ワクチン接種状況	注意・備考
1972年9月30日以前に生まれた人	ワクチン接種を1回もしていない可能性がある。 ワクチン接種歴を確かめて、2回接種歴がなければ接種を強く推奨	幼少期に罹患歴がある人への注意 ひと昔前までは臨床症状のみでの診断であったので「修飾麻疹」麻疹ではなかった可能性があり注意が必要。妊婦や乳幼児が周囲にいる場合は注意しましょう
1972年10月1日～1990年4月1日生まれの人	幼児期に医療機関で個別に接種(1回) 定期接種を受けている可能性がある。但し、特例措置の非対象者のため、 免疫が不十分な可能性 がある。 2回接種歴がなければ追加接種を推奨する	特例措置とは、2008年4月1日以降5年間実施された追加接種の措置 個別に接種しなければならず、受けられていない人が多い
1990年4月2日～2000年4月1日生まれの人	幼児期に医療機関で個別に接種(1回)のみ定期接種を受けている可能性が高い。 但し、 特例措置の対象者 ではあるが、2回接種歴がなければ追加接種を推奨する	特例措置とは、2008年4月1日以降5年間実施された追加接種の措置 個別に接種しなければならず、受けられていない人が多い
2000年4月2日以降の生まれの人	定期接種として2回接種を受けている可能性が高い。 但し2回接種歴がなければ追加接種を推奨	2019年以降、麻疹ワクチン接種率が大幅に低下しているため、2018年以降の生まれのこどもやその周囲の人は注意